

matky. Nacházíme je bezmocně lezoucí po zemi. V některých případech může veverče matka upustit při stěhování do jiného hnízda. Jakmile mládě prochladne, již o něj nejeví zájem a považuje jej za mrtvé.

Naopak ježčí hnízda v zahradách často rozhrabou psi nebo je nechtěně zničí lidé, kteří pozemek obdělávají. Ježčice se v době kojení na pár hodin od mladých vzdaluje, aby se sama nakrmila. Pokud po návratu najde hnízdo poničené, mláďata přestěhuje na vhodnější místo. Je tedy lepší vyčkat, jak se samice zachová, a mláďata hned neodebírat. Pokud se neosrstěná ježčata již vysílená plazí po okolí, pravděpodobně jejich matka zahynula a je třeba jim pomoci.



Třidenní neosrstěná mláďata ježků.

U větších osrstěných a vidoucích ježčích mláďat se řídíme váhou a velikostí. Matka mláďata kojí do stáří cca 6 týdnů, kdy mláďata váží asi 250g. Do té doby je pro ně mateřské mléko důležitou složkou jídelníčku, i když už si sama vyhledávají potravu. Ježčata nad čtvrt kila stačí v teplých letních měsících dokrmovat na zahradě. Pokud najdeme

takto malé mládě na podzim, potřebuje již pomoc v záchranné stanici.

Zvíře nalezené v přírodě si nesmíte nechat doma

V přírodě nalezená mláďata není vhodné brát si domů a odchovávat je bez odborných znalostí – podávání nevhodné potravy či léků může být pro zesláblého jedince smrtící. Ochočená mláďata bez přípravy na samostatný život nelze vypouštět do zpět do přírody a držení jakéhokoliv volně žijícího zvířete bez povolení je zákonem zakázáno. Každému mláděti je nejlépe u jeho rodičů a je-li to možné, po právu mu pak náleží život ve volné přírodě. Péči o nalezená zvířata a poradenství na území České republiky zajišťují Záchrané stanice pro volně žijící živočichy. Kontakty najdete na webových stránkách zvirevnouzi.cz.

Tento leták byl vydán Ekoporadnou Tišnovsko za podpory města Tišnova.




Ekoporadna Tišnovsko

Email: ekoporadna@tisnovsko.eu

Web: <http://tisnovsko.eu>

město
TIŠNOV



Kapesní minimum

Jarní mláďata v přírodě

Příchod teplých jarních dnů láká k procházkám do přírody, kde mohou lidé často narazit na mláďata našich ptáků a savců. Některá skutečně potřebují pomoc a některá vypadají bezbranná a opuštěná pouze zdánlivě. Při nálezů jakéhokoliv mláděte, nejprve s chladnou hlavou zhodnoťte situaci, na mládě prozatím nesahejte a zavolejte do příslušné záchranné stanice pro volně žijící živočichy o radu. Neuváženým sběrem či nevhodným zásahem mohou lidé v mnohých případech mládě pečujícím rodičům doslova ukrást a často je tím i odsoudit na smrt nebo k životu v zajetí.

Učený letec z nebe nespádí

Opeřená ptačí mláďata našich pěvců opouštějí hnízdo dříve, než jsou plně vzletná. Toto chování je přirozené a funguje jako ochrana proti predátorům. Mláďata se rozprchnou do okolí hnízda a získají tak větší šanci na přežití, než kdyby při napadení predátorem zůstala pohromadě. V blízkosti hnízda pak poskakují (kosi, drozdi) nebo posedávají na větvích (sýkory, pěnkavy), hledají

potravu a procvičují si letové dovednosti – je to jejich přirozená fáze osamostatňování. Poznáme je podle krátkého ocásku a často i zbytků prachového peří na hlavě. Ač mohou vypadat bezmocně, jejich rodiče jsou vždy poblíž, mláďata dokrmují a brání.



Osamostatňující se mláďata drozdů.

Tato mláďata nesbíráme ani neodnášíme z místa nálezu. Pokud opeřené ptačí mládě není viditelně zraněno, stačí je poponést pár metrů z cesty nebo z chodníku na strom či keř, abychom je uchránili před projíždějícími auty či pobíhajícími psy a kočkami. Důležité je si uvědomit, že mnohé druhy ptáků běžně žijí ve městech a poblíž lidských obydlí a není možné všechna mláďata zachraňovat a odchovávat uměle ve stanicích. Péče vlastních rodičů je pro ně vždy nejlepší.

Zpozornět bychom měli při nálezu holátka nebo málo opeřeného ptáčete či ptáčete v bílém prachovém peří (například mláďata dravců), které pravděpodobně vypadlo z hnízda. Kromě toho, že mu hrozí podchlazení a útok predátora, potřebuje častý přísun potravy a péči rodičů, bez které nepřežije. Ideální je návrat do hnízda (pokud jej najdeme a pokud je možné se k němu dostat) –

lidský pach ptákům nevadí! Výjimku tvoří mláďata sov, která můžeme běžně spatřit mimo hnízdo ještě v jemném šedavém opeření, které se jim postupně mění na krycí pera. Pohybují se po větvích a zkouší první let. Opět se stává, že nedopatřením mohou skončit na zemi. Pokud se dobře rozhlédneme, určitě spatříme rodiče poblíž, a proto stačí sovičku posadit na větev blízkého stromu.

Kachňata a labuřata se přirozeně drží svých rodičů. Pokud naleznete osamocené mládě nebo skupinku mláďat v prachovém peří, kontaktujte odborníky! Zvláště nebezpečná je pro taková mláďata přítomnost vody. Mohou spadnout do bazénu nebo nádoby na vodu, odkud se nedostanou ven. Prachové peří ještě není nepromokavé jako u dospělých vodních ptáků, o které se mláďata „mastí“, a proto se mohou utopit.



Zbytečně odebrané mládě zajíce.

Pozor, nejsme opuštěná!

Mláďata srnců a zajíců patří mezi tzv. odkládací mláďata, která matky krátce po porodu nechávají o samotě, aby svou přítomností nelákaly predátory. K potomkům se vracejí, jen aby je nakojily. Taková

mláďata jsou vidoucí, osrstěná a plně vyvinutá. Nevydávají žádný pach a ve chvílích nebezpečí zůstávají instinktivně přitisknutá k zemi. Zdánlivě to tedy vypadá, že mládě nehybně ležící v porostu je opuštěné, ale je tomu přesně naopak! Těmto druhům pomáháme, jen když je mládě viditelně zraněné nebo prokazatelně opuštěné. Opuštěné srnče či zajíče zmateně pobíhá (srnče navíc hlasitě píská) a beze strachu následuje člověka. Mnohá z těchto mláďat bývají velmi často zbytečně odebrána z přírody z lidské neznalosti a bohužel jsou tímto činem často odsouzena k smrti nebo trvalému životu v zajetí (pozor, první zaječí mláďata můžete nalézt klidně již v lednu!). Zejména odchov zajíčků nebývá ani záchranných stanicích jednoduchý a mláďata často hynou i stresem. U odchovaných srnčat, která si velmi snadno zvykají na člověka, je problematické jejich umístění v dospělosti, a to zejména samců, kteří bývají v době říje agresivní.

Pozor si dejte při jarních toulkách na setkání se selátky divokého prasete. Bachyně obvykle bývá poblíž připravená mláďata chránit. Zachraňujte, až když jste si opravdu jistí, že je selátko skutečně opuštěné.

Jsme neosrstěná a slepá? Pomozte nám!

Mláďata veverek, kun, lišek a ježků se rodí slepá, holá či málo osrstěná. Označujeme je jako „hnízdová mláďata“. Jsou plně odkázána na péči matky. Pokud se ocitnou mimo hnízdo, stávají se velmi zranitelná, hrozí jim dehydratace, podchlazení a v neposlední řadě i predátoři. Často nalezenými mláďaty bývají veverky, které mohou vypadnout ze stromového hnízda při silném větru či bouřce, po napadení predátorem nebo po úmrtí